

# Ergebnis-Protokoll Nationales Impfgremium (NIG)

28.Sitzung der Funktionsperiode 1. Jänner 2020 bis 31. Dezember 2023

**Zeit und Ort:** Videokonferenz am 26.05.2021, 09:00 – 11:30 Uhr

## Abkürzungsverzeichnis:

BMSGPK	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
NIG	Nationales Impfgremium (Österreich)
COVID-19	Bezeichnung der Erkrankung
WHO	World Health Organization
EUL	Emergency Use Listing Procedure
EMA	European Medicines Agency
ECDC	European Centre for Disease Prevention and Control

## 1. Präsentation Pfizer Comirnaty: 12 Monats-Daten und Jugendliche 12-15 Jahre

Pfizer-Vertreter präsentiert Studiendaten zu Comirnaty bei Kindern und Jugendlichen von 12-15 Jahren.

## 2. Impfungen aus Drittstaaten

Derzeit werden zur Einreise in Österreich Impfstoffe mit zentraler Zulassung anerkannt sowie Impfstoffe, die das WHO-EUL-Verfahren positiv abgeschlossen haben. Global könnte das Nichtanerkennen von Impfstoffen ein Problem darstellen. Eine Liste wird auch für Reisen benötigt.

Es gibt auch eine EU Verordnung des Health Security Committees (in Absprache mit ECDC und EMA) die vorgibt, welche Impfstoffe im Rahmen von Öffnungsverordnungen zugelassen werden sollen.

Punkte 3-6, 8 werden direkt in Anwendungsempfehlung eingearbeitet.

## 3. Heterologes Impfschema

Bei einem heterologen Impfschema handelt es sich zu diesem Zeitpunkt weiterhin um einen off-label use; gleichzeitig möchten viele Personen heterolog geimpft werden bzw. sind das bereits, weshalb diese Gruppe jedenfalls mitbedacht werden muss.

Weitere Daten zu heterologen Impfschemata werden erwartet.

## 4. 3. Dosis bei Risikogruppen und low/Non-Respondern

Eine 3. (bzw. 2.) Impfdosis kann angedacht werden, wenn noch nicht genügend Antikörper vorhanden sind nach den ersten beiden Impfungen (bzw. nach der Janssen-Einmal-Dosis); auch bei Risikogruppen ist eine 3. Dosis möglich, wenn nicht ausreichend Schutz gegeben ist.

## **5. Planungen für Herbst**

Aus anderen Ländern und fortlaufenden Studien werden sich sicher in den nächsten Monaten die Daten zu der Wirkdauer verdichten, um nächste Schritte besser planen zu können. Derzeit gehen wir von mindestens 9 Monaten Schutz nach 2 Dosen aus.

## **6. Empfehlung Testung geimpfter Personen insbes. in vulnerablen Bereichen**

In Risikobereichen wie APH und im Krankenhaussetting sollten geimpfte Personen jedenfalls weiterhin andere Schutzmaßnahmen wie Masken oder Testungen beachten. In vulnerablen Bereichen und wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können, soll weiterhin auch unter geimpften Personen NPI eingehalten werden. Jeder Krankenhausbereich zählt als vulnerabler Bereich. Dies wird in der Anwendungsempfehlung erläutert.

## **7. Blutspende – Rückstellung COVID-19 Impfung**

Analog zu anderen Totimpfstoffen soll nach einer COVID-19 Impfung 48 Stunden Abstand zur Blutspende eingehalten werden.

## **8. Allfälliges**

### **Andere Impfungen – Rückstellung COVID-19 Impfung**

Ein zeitlicher Abstand zwischen COVID-19 Impfungen und anderen Impfungen muss nicht mehr gegeben sein.

## **9. Kontaktpersonenmanagement**

Notwendige Adaptierungen werden besprochen.

## **10. Schluss**

Das BMSGPK dankt für die Teilnahme und den konstruktiven Austausch und beendet die Sitzung. Ein neuer Terminvorschlag für die kommende NIG-Sitzung wird zeitgerecht übermittelt.